



Säuglinge – Kindergartenalter ● 0 – 3 Jahre

Bereits bei **Säuglingen und Kleinkindern** sollte man auf Indizien achten, die auf eine **sensomotorische Wahrnehmungsbeeinträchtigung** bzw. **sensorische Integrationsstörung** hinweisen können:

- Ihr Kind fällt durch überdurchschnittlich häufige Schreiattacken auf und ist schwer zu beruhigen
- Ihr Kind kam vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt
- Ihr Kind ist nur durch sehr intensive Schaukelbewegungen wieder zu beruhigen
- Der Schlaf-Wachrhythmus ist gestört
- Es bestehen Saug- und Schluckbeschwerden, der Essrhythmus ist gestört
- Ihr Kind reagiert mit Abwehr auf Berührungen (An-, Ausziehen, Babymassage usw.)
- Ihr Kind reagiert mit Abwehr bzw. Irritation auf eine Lageveränderung (von Rücken- in Bauchlage usw.)
- Ihr Kind hat wichtige Entwicklungsschritte übersprungen (z.B. Krabbelphase)
- Ihr Kind ist auffällig ruhig oder aktivitätsarm
- Der Muskeltonus (Körperspannung) ist auffällig nieder (das Kind wirkt schlaff) oder hoch (das Kind wirkt verspannt)
- Ihr Kind geht vermehrt auf Zehenspitzen

Je früher man an der Verbesserung der Wahrnehmung arbeitet, desto besser sind die Chancen, dass es in späterer Folge nicht zu Lern- und Anpassungsschwierigkeiten kommen wird.